

Ugens Billede

Mask phenomenon efter gastroskopi



Fotos bringes med patientens tilladelse.

Rikke Højrup Petersen¹, Albert Najdi¹, Marijana Rincic Antulov^{1, 2} & Mats Jacob Hermansson Lindberg¹

1) Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland, 2) Kirurgi, Sygehus Sønderjylland

Ugeskr Læger 2024;187:V73060. doi: 10.61409/V73060

En 24-årig rask kvinde blev henvist til gastroskopi grundet periodevis globulus efter indtag af faste fødeemner. Gastroskopian blev foretaget med lokalanæstesi i svælget. Efter få minutter måtte proceduren afbrydes, fordi patienten trak hovedet væk. Man opdagede da røde pletter i hendes ansigt, og hun blev henvist til Fælles Akut Modtagelsen på grund af mistanke om allergisk reaktion. Her fandt man petekkier i huden, der strikt fulgte ansigtets kontur, petekkier i den bløde gane og bilateralt subkonjunktival blødning. Patienten fortalte, at hun under gastroskopian flere gange gav udtryk for, at hun ikke kunne få luft, men blev opfordret til at holde ud lidt endnu, indtil hun til sidst trak hovedet væk. Patienten gik hjem efter nogle timers observation. Forandringerne i ansigt og øjne svandt efter ca. ti dage.

Petekkier i ansigtet efter gastroskopi eller bronkoskopi er kasuistisk beskrevet under betegnelsen »mask phenomenon« [1-4] og kan endog også ses efter opkastninger [5]. Fællesnævneren i kasuistikkerne er, at patienterne oplevede dyspnø under proceduren. Årsagen til fænomenet formodes at være kapillærruptur på grund af intratorakal trykstigning i forbindelse med Valsalva-manøvre.

Korrespondance Rikke Højrup Petersen. E-mail: rikke.hojrup.petersen@rsyd.dk

Antaget 12. august 2025

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Side 1 af 2

Publiceret på ugeskriftet.dk 24. november 2025

Interessekonflikter ingen. Alle forfattere har indsendt ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest. Disse er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk.

Artikelreference Ugeskr Læger 2025;187:V73060

doi 10.61409/V73060

Open Access under Creative Commons License [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

REFERENCER

1. Ozaslan E, Purnak T, Senel E. Facial petechiae as a complication of diagnostic endoscopy. *Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat.* 2010;19(4):21-22
2. Christou LG, Saugos V, Vagias I, et al. Red face, postendoscopy. *BMJ Case Rep.* 2011;2011:bcr0920103375. <https://doi.org/10.1136/bcr.09.2010.3375>
3. Adigüen E, Eroglu N, Öztaş M, Güner MA. A rare cause of facial purpura: endoscopy. *Endoscopy.* 2007;39 Suppl 1:E216. <https://doi.org/10.1055/s-2007-966317>
4. Aw DK, Tan MZ, Yip AC, et al. Unusual complication of bronchoscopy. *Respir Med Case Rep.* 2016;19:173-176. <https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2016.09.004>
5. Ono R, Takahashi H, Fukushima K. Emesis-induced facial purpura as a mask phenomenon. *BMJ Case Rep.* 2021;14(2):e241456. <https://doi.org/10.1136/bcr-2020-241456>