

## VIDENSKAB OG PRAKSIS | EVIDENSBASERET MEDICIN

[6]. Der er nu god og overbevisende evidens for at rekonstruere det rektale reservoir hos alle patienter med en lav anastomose for at opnå de bedste funktionelle resultater. Brugen af en STE sparer tid under operationen, da den er hurtigere at anlægge end en CJP og giver færre staplerlinjer, hvilket teoretisk giver mindre risiko for anastomoselækage. Dette har dog ikke kunnet bekræftes i Cohcraneanalysen. Der er fortsat brug for større randomiserede kliniske undersøgelser til at sammenligne CJP og STE både mht. langtidsresultaterne for funktionen og hyppighed af komplikationer. En sådan undersøgelse er i øjeblikket i gang i Schweiz og forventes færdiggjort i 2012.

Hos de radikalt opererede patienter er 5-års overlevelsen i Danmark efterhånden kommet helt op på 65%. Dette betyder, at de fleste patienter kommer til at leve mange år efter deres kræftbehandling er overstået. For denne store patientgruppe er det væsentligt, at de opnår kontrol over deres tarmfunktion, for at de kan føre et normalt liv med en høj livskvalitet som overlevende kræftpatienter. Der bør derfor ofres mere opmærksomhed på de forventelige funktionelle resultater, når et behandlingsforløb planlægges, og ikke kun ses på de onkologiske resultater. I regi af *Danish Colorectal Cancer Group* (DCCG) gennemføres i øjeblikket et større studie, hvor omfanget af funktionelle problemer hos danske patienter forsøges kortlagt. I studiet undersøges også omfanget af blæregener og seksuelle gener og påvirkningen af patienternes livskvalitet.

Korrespondance: *Katrine J. Emmertsen*, Kirurgisk Afdeling P, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, DK-8000 Århus C.  
E-mail: katrineemertsen@dadlnet.dk

Antaget: 7. september 2008  
Interessekonflikter: Ingen

**Litteratur**

1. MacFarlane JK, Ryall RD, Heald RJ. Mesorectal excision for rectal cancer. *Lancet* 1993;341:457-60.
2. Lundby L, Krogh K, Jensen VJ et al. Long-term anorectal dysfunction after postoperative radiotherapy for rectal cancer. *Dis Colon Rectum* 2005;48:1343-9.
3. Pedersen IK, Christiansen J, Hint K et al. Anorectal function after low anterior resection for carcinoma. *Ann Surg* 1986;204:133-5.
4. Brown CJ, Fenech DS, McLeod RS. Reconstructive techniques after rectal resection for rectal cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;(2):CD006040.
5. Fazio VW, Zutshi M, Remzi FH et al. A randomized multicenter trial to compare long-term functional outcome, quality of life, and complications of surgical procedures for low rectal cancers. *Ann Surg* 2007;246:481-8.
6. Harling H et al. Årsrapport 2006 fra KRC-databasen, DCCG. DCCG, 2008.

**Lægemiddelstyrelsen****Tilskud til lægemidler**

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 1. december 2008 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(M-01-AE-01) Burana tabletter\*, Orion Corporation  
(N-06-BA-04) Citalopram »BMM Pharma« tabletter\*, BioPhausia A/S  
(C-09-AA-04) Coversyl Arginine tabletter\*, EuroPharmaDK ApS  
(C-09-BA-04) Coversyl Arginine Plus tabletter\*, EuroPharmaDK ApS  
(N-06-AB-03) Fluoxetin »BMM Pharma« tabletter\*, BioPhausia A/S  
(A-10-BH-01) Januvia tabletter\*, Orifarm A/S  
(A-10-BH-01) Januvia tabletter\*, PharmaCoDane ApS  
(J-01-CA-08) Penomax tabletter\*, Orion Corporation Orion Pharma  
(C-09-AA-04) Prestarium tabletter\*, 2care4 ApS  
(C-09-AA-05) Ramipril »Ranbaxy« tabletter\*, Ranbaxy Pharma AB

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(N-06-AX-21) Cymbalta kapsler\*, EuroPharmaDK ApS

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: moderat til svær depression.

En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(J-07-AL-01) Pneumovax injektionsvæske, Sanofi Pasteur MSD

gruppe klausuleret til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul:

Personer med udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation, manglende miltfunktion, likvorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, immunsupprimerede (f.eks. ved hiv-infektion eller lymfom). Desuden til personer under 18 år med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse, hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter ekskl. agammaglobulinæmi og SCID.

En betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 1. december 2008.

\*) Omfattet af tilskudsprissystemet.