

rumkoncentrationer > 3.150 mikromol/l [4]. Symptomerne opstår typisk inden for få timer, men kan også være flere timer forsinkede f.eks. ved indtagelse af depotformuleringer [5]. Valproatforgiftning behandles i Danmark med aktivt kul og symptomatisk behandling. Ved massiv overdosering kan hæmodialyse øge eliminationen af valproat, men der savnes klare retningslinjer. Naloxon har været anvendt til komatøse valproatforgiftede patienter i samme doser, som anvendes ved opioidoverdosering. Karnitinbehandling anvendes få steder for at modvirke en alternativ omsætning af valproat, der formodes at føre til dannelse af hepatotoksiske metabolitter. Denne behandling kunne derved muligvis forebygge hepatotoksicitet/encefalopati [2]. Karnitin anvendes for nuværende ikke i Danmark. Vi anbefaler, at et forgiftet barn indlægges mhp. behandling med aktivt kul, telemetri, observation af blodtryk, respiration, bevidsthedsniveau, parakliniske prøver og understøttende behandling. Barnet kan udskrives, når det ikke læn-

gere er klinisk eller paraklinisk påvirket, er blodtryk og puls stabilt, og serumvalproat igen er i terapeutisk niveau. Depotgranulat i kapsler kan med fordel anvendes hos mindre børn for at forebygge overdosering.

KORRESPONDANCE: Thalia Marie Blicher, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. E-mail: thalia@dadlnet.dk

ANTAGET: 11. oktober 2011

FØRST PÅ NETTET: 19. december 2011

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatterens ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATUR

1. WWW.produktresumé.dk Delepsine tabletter 300 mg (26. okt 2011).
2. Lheureux PER, Penalzoza A, Zahir S et al. Science review: carnitine in the treatment of valproic acid-induced toxicity – what is the evidence? Crit Care 2005;9:431-40.
3. Schnabel R, Rambeck B, Janssen F. Fatal intoxication with sodium valproate. Lancet 1984;(8370):221-2.
4. Spiller HA, Krenzelok EP, Klein-Schwartz W et al. Multicenter case series of valproic acid ingestion: serum concentrations and toxicity. J Clin Toxicol 2000;38:755-60.
5. Manoguerra AS, Erdman AR, Woolf AD et al. Valproic acid poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol (Phila);2008;46:661-76.



SUNDHEDSSTYRELSEN

TILSKUD TIL LÆGEMIDLER

Sundhedsstyrelsen meddeler, at der pr. 2. april 2012 ydes generelt uklausuleret tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

- (N-05-AX-12) Abilify oral opløsning*, EuroPharma.DK ApS
- (D-07-AC-01) Betnovate creme*, EuroPharma.DK ApS
- (D-07-AC-01) Betnovate creme*, Orifarm A/S
- (N-05-AF-05) Clopixol Depot injektionsvæske*, Paranova Danmark A/S
- (A-07-EA-02) Colifoam rektalskum*, 2care4 ApS
- (A-10-BD-07) Janumet tabletter*, Morelco Pharma Danmark
- (A-10-AE-04) Lantus Solo Star injektionsvæske*, Paranova Danmark A/S
- (R-06-AE-09) Levocetirizin »Krka« tabletter*, Krka Sverige AB
- (C-08-CA-01) Norvasc tabletter*, 2care4 ApS
- (N-02-AH-03) Olanzapin »Bluefish« smeltetabletter, Bluefish Pharmaceuticals AB
- (A-02-BC-01) Omeprazol »Pensa« enterokapsler*, Pensa Pharma AB
- (R-03-BA-02) Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver*, Paranova Danmark A/S
- (N-05-AH-04) Quetiapin »Actavis« tabletter*, Actavis Nordic A/S
- (N-05-AH-04) Quetiapin »Arrow« tabletter*, Arrow Pharma ApS
- (N-05-AH-04) Quetiapin »KRKA« tabletter*, Krka Sverige AB
- (N-05-AH-04) Quetiapin »Sandoz« tabletter*, Sandoz A/S
- (N-05-AH-04) Quetiapin »Teva« tabletter*, Teva Denmark A/S
- (N-05-AH-04) Stadaquel tabletter*, Stada Arzneimittel AG
- (R-03-DC-03) Singulair tabletter*, Singad Pharma ApS
- (S-01-EC-11) Yellox øjendråber, Bausch og Lomb Limited

Der ydes generelt uklausuleret tilskud til følgende lægemidler:

- (N-03-AX-12) Gabapentin »2care4« tabletter*, 2care4 ApS

Lægemidlet er uklausuleret til personer, der opfylder følgende sygdomsklausul:

Epilepsi. En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

- (C-10-AA-04) Lescol XL depottabletter*, EuroPharma.DK ApS

Lægemidlet er uklausuleret til personer, der opfylder følgende sygdomsklausul: Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

- (M-03-BX-02) Tizanidin »2care4« tabletter*, 2care4 ApS

Lægemidlet er uklausuleret til personer, der opfylder følgende sygdomsklausul: Kronliske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet. En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

- (N-05-AH-04) Quetiapin »Teva« depottabletter*, Teva Denmark A/S

Lægemidlet er uklausuleret til personer, der opfylder følgende sygdomsklausul: Skizofreni, bipolar lidelse, andre psykoser og supplerende behandling ved depression. Til depression kun hvor supplerende behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har været utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald. En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 2. april 2012.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.