

Månedens billede



MÅNEDENS BILLEDE

redigeres af:

*Tove Agner,
Margrethe Herning,
Jens Otto Lund,
Karen-Lisbeth Bay Dirksen
og Peter Skinhøj*

En patient med pludseligt opståede synsproblemer blev undersøgt efter pupildilatation med Metaoxedrinøjendråber på mistanke om en blodprop i venstre øje. I de efterfølgende dage fik hun kraftig hævelse af øjenomgivelserne. Samme symptomer udviklede sig igen nogle måneder senere efter en ny eksponering for Metaoxedrinøjendråber.

Man havde mistanke om kontaktallergi over for Metaoxedrin, og patienten blev allergiudredt. En epikutantest viste meget svær allergi over for phenylephrin, som er det aktive indholdsstof i Metaoxedrin. Andre test var negative.

Generelt bør man have kontaktallergi over for øjendråber in mente ved hævelse og eksem i øjenomgivelserne. Udredning for allergi er kompliceret, idet der er mange forskellige indholdsstoffer i øjendråberne, og krydsreaktioner til andre medikamenter kan forekomme.

Phenylephrinøjendråber anvendes hyppigt af øjenlæger til pupildilatation, og kontaktallergi er en kendt bivirkning [1]. Kraftig allergisk reaktion kan forekomme, og præparatet bør derfor bruges med omtanke.

*Nanna Damsgaard,
Afdeling for Hud- og Allergi, Gentofte Hospital
E-mail: damsgaard.nanna@gmail.com
Jarvad Nouri Hajari,
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
Steffen Heegaard,
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
Lone Skov
Afdeling for Hud- og Allergi, Gentofte Hospital*

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatterens ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk