


Når patienten selv stiller diagnosen



En 68-årig mand henvendte sig på grund af hjertebanken under løb. Symptomet forekom anfaldsvis, og når det stod på, var han ude af stand til at fortsætte. Pulsen faldt derefter til ro efter få minutter. Han havde normalt en puls på 60 slag/min, hvilket blev bekræftet ved konsultationen. Han medbragte en udskrift fra sit pulsur. Denne dokumenterede atrieflagren med en frekvens på 240 og vekslende 1:2- og 1:1-overledning. Da man oplyste patienten om, at det drejede sig om atrieflagren, svarede han, at det havde han også selv regnet med. Han blev henvist til Rigshospitalet, hvor der

konstateredes både atrieflimren og -flagren. Han påbegyndte blodfortyndende behandling, og der blev senere udført en vellykket ablation. Ved en efterfølgende arbejdstest sås der ingen arytmier.

KORRESPONDANCE: Morten Holm. E-mail: drholm@ofir.dk

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATUR

1. <http://en.wikipedia.org/wiki/Self-diagnosis> (10. mar 2015).

MÅNEDENS BILLEDE

redigeres af:

Tove Agner

Margrethe Herning

Jens Otto Lund

Peter Skinhøj og

Karen Lisbeth Bay

Dirksen

Ugeskr Læger

2015;177:V66567