

Akut opståede, smertefulde udslæt på begge hænder



En 72-årig mand, der havde haft kronisk lymfatisk leukæmi i to et halvt år og tidligere dyb venøs trombose tre gange, hvorfor han var i warfarinbehandling, blev set i en akutmodtagelse pga. akut opstået smertefulde udslæt på begge hænder. Udslættet havde varet i fire dage. Han angav, at forandringerne startede som små, smertefulde, røde elementer med blæredannelse. Elementerne var ikke kløende. Han havde ikke haft feber eller påvirket almentilstand i forløbet, men dog haft hoste i 14 dage op til indlæggelsen. Hans egen læge havde uden effekt forsøgt behandling med penicillin.

Ved en objektiv undersøgelse fandt man dorsalt på begge hænder op til 2 cm store pudeformede, lette forhøjninger i huden. Elementerne var infiltrerede, højerlymatøse og med stedvis hæmragisk tilblanding. Der var ingen pustler, pyodermasuspekterede sår eller andre hudforandringer.

Efter aftale med en dermatologisk vagthavende blev patienten straks sat i behandling med systemisk prednisolon på mistanke om morbus Sweet. Dagen efter blev patienten vurderet i et dermatologisk ambulatorium, og diagnosen blev bekræftet ved biopsi. Forandringerne bedredes på behandlingen med prednisolon.

Sygehistorien er til dels klassisk for mb *Sweet of the dorsal hand* (undergruppe af neutrofile dermatoser), i og med at tilstanden opstod pludseligt hos en i forvejen kronisk syg patient samt ved udseende og lokalisation og ved, at forandringerne bedredes ved behandling med prednisolon. Det er atypisk, at patienten var afebril i forløbet.

Moug Al-Bakri

E-mail: mougabakri@yahoo.com

Barbara Michalska

Akutmodtagelsen, Nykøbing F. Sygehus

Linnea Rishøj Thorlacius

Dermatologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital, Roskilde

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatterens ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

UGENS BILLEDE

redigeres af:

Tove Agner

Ida Gjørup

Karen-Lisbeth Bay

Dirksen og

Peter Hovind

Ugeskr Læger

2016;178:V67955