

Nyhed

Delirium hos indlagte ældre patienter kan forebygges

Delirium er en alvorlig og hyppigt forekommende tilstand blandt indlagte skrøbelige ældre, som bør udredes grundigt og håndteres tværfagligt.

Delirium er en alvorlig og hyppigt forekommende tilstand blandt indlagte ældre. Tilstanden er karakteriseret ved nedsat opmærksomhed, svækket kognitiv funktion med nedsat hukommelse, desorientering samt døgnrytmeforstyrrelser og ændret psykomotorik. Statusartiklen af Schultz et al gennemgår forebyggelse, opsporing, forekomst, årsager, symptomer, prognose og nonfarmakologisk og farmakologisk behandling. Forfatterne konkluderer, at udløsende årsager skal udredes grundigt, og at tilstanden skal håndteres tværfagligt med nonfarmakologiske tiltag og nogle gange også med farmaka, som dog ikke bør anvendes rutinemæssigt.

Læs statusartikel

[Opsporing, udredning og håndtering af delirium hos indlagte ældre](#)

Martin Schultz, Johannes Riis Jensen, Maurice Antoine Lembeck, Kirsten Vinding, Tina Lindenskov Carlsen, Susanne Stabel, Helle Svenningsen, Jens Ulrik Rosholm & Hanne Pedersen



Delirblomst

Redaktionen